

Τύποι προσβολής μυκήτων

- 1) Περιφερική ονυχομυκητίαση: η πιο συνηθισμένη, ξεκινά με προσβολή του ελεύθερου άκρου του νυχιού και στη συνέχεια επεκτείνεται στο υπονύχιο.
- 2) Λευκή επιφανειακή ονυχομυκητίαση: προσβολή της ονυχιαίας πλάκας που γίνεται λευκή και αδιαφανής.
- 3) Εγγύς υπονύχια ονυχομυκητίαση: ξεκινά με προσβολή του νυχιού πλησίον του υπονυχίου.
- 4) Καντινιασική ονυχομυκητίαση (ολική) : υπεύθυνος είναι ο μύκητας *Candida albicans* και οι βλάβες των νυχιών ξεκινούν από την εγγύς πτυχή και τα πλάγια του νυχιού, ενώ μπορεί να υπάρχει και φλεγμονή με πόνο και οίδημα στο περιονύχιο.



Καλλιέργεια νυχιού



Τι είναι?

- Ανώδυνη και γρήγορη εξέταση.
- Παίρνουμε ξύσμα κάτω από το πάσχων νύχι.
- Το νύχι πρέπει να είναι καθαρό από οποιαδήποτε θεραπεία για 20 μέρες.
- Τα αποτελέσματα βγαίνουν σε 20-30 μέρες.