

ΝΕΥΡΙΤΙΔΕΣ - ΝΕΥΡΟΠΑΘΕΙΕΣ

Ο ορος ΝΕΥΡΙΤΙΔΑ αναφέρεται ως φλεγμονώδης
παθήση των νευρών.

Ο ορος αυτός όμως χρησιμοποιείται και για τις μη
φλεγμονώδεις παθήσεις των νευρών τις
ΝΕΥΡΟΠΑΘΕΙΕΣ

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΝΕΥΡΙΤΙΔΩΝ

-ΜΟΝΟΝΕΥΡΙΤΙΔΕΣ(μαζί με τις πολλαπλές
μονονευριτιδες)

-ΠΟΛΥΝΕΥΡΙΤΙΔΕΣ

ΜΟΝΟΝΕΥΡΙΤΙΔΑ ΚΑΙ

ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΜΟΝΟΝΕΥΡΙΤΙΔΑ

Στις μορφες αυτες βλαπτονται ενα η'περισσοτερα περιφερικα νευρα.

Το ειδος της μυικης αδυναμιας,των αισθητικων διαταραχων και των μεταβολων των τενοντιων αντανακλαστικων εξαρταται απο την ανατομικη κατανομη των νευρων που καθε φορα προσβαλονται.

ΜΟΝΟΝΕΥΡΙΤΙΔΕΣ ΣΤΑ ΑΝΩ ΑΚΡΑ

- Παραλυση του μακρου θωρακικου νευρου(Μετα απο πιεση στον ωμο η´ μεταφορα μεγαλων βαρων)
- Παραλυση του υπερπλατιου νευρου:Καταγμα, η' εξαρθρημα του ωμου.
 - Ανωτερος τυπος παραλυσης του βραχιονιου πλεγματος; Βλαβη του ανω κορμου(ριζεςΑ5-Α6)

- Κατωτερος τυπος παραλυσης του βραχιονιου πλεγματος:Βλαβη του κορμου του βραχιονιου πλεγματος(ΡΙΖΕΣ Α8-Θ1).
- Παραλυση του μασχαλιαιου νευρου:Μετα απο καταγμα του αυχενα του βραχιονιου οστου.
- Παραλυση του κερκιδικου νευρου:Τραυματικη βλαβη(πιεση στη μασχαλη κατα την χρηση δεκανικιου).

- Παραλυση του μεσου νευρου:Τραυματικη βλαβη στη μασχαλη απο εξαρθημα του ωμου η' σε αλλο σημειο.
- Παραλυση του ωλενιου νευρου:Βλαπτεται κυριως στη περιοχη του αγκωνα ως αποτελεσμα καταγματος η' εξαρθηματος

ΜΟΝΟΝΕΥΡΙΤΙΔΕΣ ΣΤΑ ΚΑΤΩ ΑΚΡΑ

- Προσβολη του μηροδερματικου νευρου:Το μηροδερματικο νευρο ειναι αισθητικο νευρο(παραισθητικη μηραλγια)
- Παραλυση του μηριαιου νευρου:Βλαπτεται συχνα σε καταγματα και εξαρθηματα της κατ'ισχιον αρθρωσης και της πυελου.
- Παραλυση του ισχιακου νευρου:Καταγματα της πυελου η' του μηριαιου οστου,τραυματα του μηρου και του γλουτου καθως και απο ενεσεις.